



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Λιβαδειά 13-08-2019

Αρ.Πρωτ.: 9374

site

Τμήμα : Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου.
ΦΙΛΩΝΟΣ 35-39, 32131 ΛΙΒΑΔΕΙΑ

ΠΡΟΣ : Ως Πίνακας Διανομής.

Πληροφορίες : Χρυσόστομος Ν. Σίσκος

Τηλεφ. : 22613 - 50175

Fax. : 22610 - 21758

E-mail : chsiskos@viotia.gr

ΔΗΜΙΟΣ	ΦΕΚΤΟΜΕΝΟΥ
Αριθ Πρωτ	6618
ΕΛΛΗΝΙΚΗ	21-08-2019

**2^ο ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΒΑΜΒΑΚΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ.**

Η ΔΑΟΚ-ΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ σε συνεργασία με το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Βόλου ενημερώνει τους βαμβακοπαραγωγούς της Π.Ε ΒΟΙΩΤΙΑΣ για τις απαραίτητες ενέργειες αποτελεσματικής φυτοπροστασίας της βαμβακοκαλλιέργειας.

1. Στόχοι

1.1. Η ενημέρωση των βαμβακοπαραγωγών για την αποτελεσματική φυτοπροστασία στον πραγματικό καλλιεργητικό χρόνο.

1.2. Η τακτική παρακολούθηση κάθε βαμβακοχώραφου σύμφωνα με τα πραγματικά δεδομένα, και η εφαρμογή συγκεκριμένων καλλιεργητικών πρακτικών φυτοπροστασίας στο σωστό χρόνο.

2. Διαπιστώσεις

2.1. Οι βαμβακοκαλλιέργειες κατά πλειοψηφία βρίσκονται στο στάδιο καρυδιών και της ολοκλήρωσης της καρποφορίας.

2.2. Η μέχρι τώρα εξέλιξη των καλλιεργειών των βαμβακοφύτων θεωρείται όψιμη.

2.3. Στις περιοχές όπου εγκαταστάθηκαν φερομονικές παγίδες για πράσινο και ρόδινο σκουλήκι διαπιστώθηκαν συλλήψεις ενηλίκων (πτεταλούδων). Στις περιοχές 1) ΣΑΑΚ Θεσπίων (Ξινός) και 2) ΣΑΑΚ Αγίας Τριάδας διαπιστώθηκε αύξηση συλλήψεων του πράσινου.

2.4 Όσον αφορά το ρόδινο σκουλήκι, διαπιστώθηκε ελαφρά αυξημένος πληθυσμός σε περιοχές της Θήβας.

3. Συστάσεις-καλλιεργητικές πρακτικές

Συστήνεται στους βαμβακοπαραγωγούς να παρακολουθούν τις βαμβακοφυτείες τους κάθε 3-4 ημέρες για την ύπαρξη ή όχι νεαρών προνυμφών της 3^{ης} γενεάς του πράσινου σκουληκιού. Ιδιαίτερη προσοχή να δοθεί το αμέσως επόμενο διάστημα.

Η παρακολούθηση των βαμβακοκαλλιεργειών συνιστάται να γίνεται πρωινές ή απογευματινές ώρες διασχίζοντας το χωράφι διαγώνια και εξετάζοντας 100 φυτά σε διαφορετικά σημεία της διαγώνιου.

Επίσης συστήνεται να παρακολουθούν τις μετεωρολογικές προγνώσεις για την αποφυγή περιπτώσεων ψεκασμών (οι αυξημένες θερμοκρασίες οδηγούν σε μείωση του πληθυσμού των εντόμων).

4. Εφαρμογή ψεκασμών με Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα

4.1. Πράσινο σκουλήκι